

Nasentropfen Rhinog. pro infantibus MP/Rhinog. Arg. diacet. prot. MP

**Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!**

#### **Anwendungsgebiete**

Bei Reizungen der Nasenschleimhaut mit Sekretbildung (seröse Rhinitis) bei Kindern unter 12 Jahren

#### **Gegenanzeigen**

Die Nasentropfen dürfen nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile sowie bei Verletzungen und Wunden im Bereich der Nase.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Langfristige Anwendung oder Dauergebrauch ist zu vermeiden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Bisher sind keine bekannt. Die gleichzeitige Anwendung anderer Nasentropfen bzw. -sprays ist zu vermeiden.

#### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Maximal 6-mal täglich 1 bis 2 Tropfen in jedes Nasenloch mit nach hinten abgewinkeltem Kopf einträufeln, dann den Kopf kurz tief nach vorn herunterbeugen und eventuell aus dem Nasenloch austretende Restmenge vorsichtig auftupfen.

#### **Unerwünschte Wirkungen**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann bei empfindlichen Patienten gelegentlich eine leichte Reizung der Nasenschleimhaut auftreten.

#### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes**

Das Präparat darf nach Ablauf der aufgedruckten Verwendbarkeitsfrist nicht mehr angewendet werden.

Nach Anbruch 4 Wochen anwendbar.

#### **Fleckentfernung**

Die Nasentropfen können braune Flecken auf Textilien hinterlassen. Nach dem Waschen verbliebene Flecken können mit Ethanol-haltiger Iodlösung und einer Nachbehandlung mit 10%iger Natriumthiosulfat-Lösung entfernt werden.