

Zusammensetzung:	Emulgierender Cetylstearylalkohol, Typ A	Ph.Eur.	21,0g
	2-Ethylhexyllaurat (Rofetan 148)	DAC	10,0g
	Glycerol 85%	Ph.Eur.	5,0g
	Gereinigtes Wasser	Ph.Eur.	ad 100,0g

Alle Nennungen von Arzneibüchern beziehen sich auf die jeweils aktuellen Fassungen, sofern nichts anderes angegeben ist. Falls die Qualität der verwendeten Referenzsubstanzen nicht näher bezeichnet ist, entspricht diese der unter Zusammensetzung angegebenen.

Eigenschaften / Beschreibung

weiße, weiche, mit Wasser von der Haut abwaschbare Zubereitung von gleichmäßiger Beschaffenheit, Geruch schwach wahrnehmbar

Identitätsprüfung

A.: Dünnschichtchromatografie

Die Untersuchung erfolgt mittels Dünnschichtchromatografie auf HPTLC – Platten mit einer Schicht Kieselgel R

Untersuchungslösung

0,4 g Zubereitung werden mit 5 ml einer Mischung von gleichen Volumenteilen 2-Propanol R und Petrolether R gemischt.

Referenzlösung

80 mg emulgierender Cetylstearylalkohol Typ A und 40 mg 2-Ethylhexyllaurat werden mit 5 ml der 2-Propanol-Petrolether-Mischung gemischt.

Es werden jeweils 2 µl der Untersuchungs- bzw. Referenzlösung punktförmig aufgetragen.

Eluent

Hexan R + Ether R + Methanol R (65 + 20 + 15)

Detektion und Auswertung

Die Platte wird an der Luft getrocknet und im ultravioletten Licht bei 254 nm ausgewertet. Im Chromatogramm der Untersuchungslösung darf kein deutlich sichtbarer Fleck auftreten.

Anschließend wird mit einer wässrigen Lösung von Ammoniumanilinonaphtalinsulfonat RN (8-Anilinonaphtalin-1-sulfonsäure, Ammoniumsalz) (1 g/l) besprüht, bei 80°C kurz getrocknet und im ultravioletten Licht bei 365 nm ausgewertet.

Die in Untersuchungs- und Referenzlösung auftretenden Flecke müssen in R_f-Wert und Intensität übereinstimmen:

im mittleren Drittel der Fleck des emulgierenden Cetylstearylalkohols Typ A
im obere Drittel der Fleck des 2-Ethylhexyllaurats

Schwache Nebenflecken können auftreten.

Anionische hydro. Creme ohne Konservierungsstoffe

Seite 2/2

B.: Emulgierender Cetylstearylalkohol, Typ A

Etwa 0,5g Salbe werden mit 2 ml Wasser R, 2 Tropfen Dimethylgelb-Indikator, 5 Tropfen verdünnter Schwefelsäure R und 2 ml Chloroform R versetzt und 5 s geschüttelt.

Nach dem Entmischen zeigt die Chloroformschicht eine violettrote Färbung.

Dimethylgelb-Indikator

0,100g Dimethylgelb (4-(Dimethylamino)azobenzol) werden in 100 ml Ethanol 96% R gelöst.

C.: Glycerol

0,5 g Zubereitung werden mit 0,5 g Kaliumhydrogensulfat R in einem Porzellantiegel verrieben. Die Mischung wird in einem Reagenzglas über freier Flamme so lange erhitzt, bis Dämpfe entstehen. Die Dämpfe färben ein mit Neßlers Reagenz R getränktes Filterpapier schwarz.

alternativ:

Etwa 1 g Zubereitung wird mit 0,5 ml Salpetersäure R gemischt. Die Mischung wird mit 0,5 ml Kaliumdichromat-Lösung R überschichtet. An der Grenzschicht der beiden Flüssigkeiten entsteht ein blauer Ring, der einige Zeit bestehen bleibt, ohne dass die Farbe in die untere Schicht diffundiert.

D.: Verseifungszahl

Die Zubereitung muss der Prüfung auf Reinheit „Verseifungszahl“ entsprechen.

E.: Mischbarkeit mit Wasser

0,5 g Zubereitung werden mit 10 ml Wasser R 1 min lang gerührt. Es muss eine milchige Mischung entstehen, die vereinzelt vorkommende Agglomerate nicht dispergierter Zubereitung enthalten kann.

Verseifungszahl: 16 bis 22

Gehalt Wasser: 61,0 bis 67,0%

Verwendbarkeit: 6 Monate (Nach Erstentnahme 30 Tage verwendbar)

Stand: Juli 2012